

## Grundbegriffe der Informatik Musterlösung zu Aufgabenblatt 6

### Aufgabe 6.1 (2 Punkte)

Gegeben seien zwei Typkonvertierungsfunktionen aus Java:  $f : \text{int} \rightarrow \text{double}$  und  $g : \text{double} \rightarrow \text{int}$ . Welche der beiden folgenden Aussagen ist wahr? Begründen Sie Ihre Antwort.

- $\forall x \in \text{double} : (f \circ g)(x) = x$
- $\forall x \in \text{int} : (g \circ f)(x) = x$

### Lösung 6.1

Die zweite Aussage ist wahr, da bei der Konvertierung von `int` nach `double` keine Information verloren geht.

Die erste Aussage stimmt dagegen nicht. So ist z.B.  $(f \circ g)(4.2) \neq 4.2$ , da  $g(4.2) = 4$  und  $f(4) \neq 4.2$ .

### Aufgabe 6.2 (2+3 Punkte)

Gegeben seien die beiden Abbildungen  $f : X \rightarrow Y$  und  $g : Y \rightarrow Z$ . Zeigen Sie:

- a)  $f$  und  $g$  sind injektiv  $\Rightarrow g \circ f$  ist injektiv.
- b)  $f$  ist nicht surjektiv und  $g$  ist injektiv  $\Rightarrow g \circ f$  ist nicht surjektiv.

### Lösung 6.2

- a)  $f$  ist injektiv, d.h.  $\forall x_0, x_1 \in X : x_0 \neq x_1 \Rightarrow f(x_0) \neq f(x_1)$  und es gilt zudem  $f(x_0), f(x_1) \in Y$ .

Außerdem ist  $g$  injektiv, d.h.  $\forall y_0, y_1 \in Y : y_0 \neq y_1 \Rightarrow g(y_0) \neq g(y_1)$ . Da dies für alle Elemente aus  $Y$  gilt, gilt dies auch für  $f(x_0)$  und  $f(x_1) \Rightarrow (g \circ f)(x_0) = g(f(x_0)) \neq g(f(x_1)) = (g \circ f)(x_1)$ , für  $x_0 \neq x_1$ . Also ist  $g \circ f$  auch injektiv.

- b) Zu zeigen:  $g \circ f$  ist nicht surjektiv, also:  $\exists z \in Z : \forall x \in X : (g \circ f)(x) \neq z$

$f$  ist nicht surjektiv:  $\exists y' \in Y : \forall x \in X : f(x) \neq y'$ .

Da  $g$  injektiv ist:  $\forall y_0, y_1 \in Y : y_0 \neq y_1 \Rightarrow g(y_0) \neq g(y_1)$

Sei  $z = g(y')$  und  $x$  ein beliebiges Element aus  $X$  :  $f(x) \stackrel{f \text{ nicht surjektiv}}{\neq} y' \Rightarrow g(f(x)) \neq z$

$g \circ f$  ist also nicht surjektiv.

**Aufgabe 6.3 (1+2+4 Punkte)**

Gegeben sei folgender Homomorphismus

$$h : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^* \text{ mit } h(0) = 01, h(1) = 0$$

- Geben Sie der Reihe nach alle  $h^i(0)$  für  $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$  an.
- Geben Sie eine rekursive Beschreibung der Folge  $x_n = h^n(0)$ ,  $n \in \mathbb{N}_+$  an, ohne sich auf obige Definition als Homomorphismus zu beziehen.
- Beweisen Sie Ihre Aussage aus Teilaufgabe b) durch vollständige Induktion.

**Lösung 6.3**

$$a) h(0) = 01, h^2(0) = 010, h^3(0) = 01001, h^4(0) = 01001010, h^5(0) = 0100101001001$$

$$b) x_1 = 01, x_2 = 010, \forall n \geq 3 : x_n = x_{n-1}x_{n-2}$$

$$c) \text{Induktionsanfang: } h^1(0) = 01, h^2(0) = 010, h^3(0) = 01001 = h^2(0) \cdot h^1(0) \checkmark$$

**Induktionsvoraussetzung:**

Für ein beliebiges, aber festes  $n \in \mathbb{N}_+$  gilt:

$$x_n = x_{n-1}x_{n-2}$$

**Induktionsschluss:** Wir zeigen, dass dann auch gilt:  $x_{n+1} = x_nx_{n-1}$

$$x_{n+1} \stackrel{Def.}{=} h(x_n) \stackrel{IV}{=} h(x_{n-1}x_{n-2}) \stackrel{Homomorphismus}{=} h(x_{n-1})h(x_{n-2}) \stackrel{Def.}{=} x_nx_{n-1}$$

*Hinweis:* Für den IA gibt es 1.5 Punkte, IV 1 Punkt und IS 1.5 Punkte

**Aufgabe 6.4 (2 Punkte)**

Geben Sie einen surjektiven Homomorphismus  $h$  an, der

$L_1 = \{b^i a^n b^j c^n b^k \mid i \in \mathbb{N}_+, j, k, n \in \mathbb{N}_0\}$  auf  $L_2 = \{ccc\}^*$  abbildet.

**Lösung 6.4**

$$h(c) = ccc, h(a) = h(b) = \varepsilon$$


**Aufgabe 6.5 (4+1 Punkte)**

Für eine Zeichenmenge  $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$  seien folgende absolute Häufigkeiten  $P$  gegeben:

Zeichen	a	b	c	d	e	f	g	h
P	8	7	6	5	4	3	2	1

- a) Konstruieren Sie den für den Huffman-Code benötigten Baum.  
 b) Geben Sie die Codierung von **fade** mit dem zu dem Baum gehörenden Huffman-Code an.

**Lösung 6.5**



*Hinweis:* Für jeden falsch zusammengefassten Knoten gibt es einen Punkt Abzug.

b) 000111011010